

aula particular, ahhhh, não, num, não cabe; é, é. eu sei que a justiça será feita porque é ridículo; então, quando eu fui ao banheiro, que eu lavei a mão ...; (...); eu fui levantei, e quando eu fui lá ao banheiro, limpei a mão, quando eu dei pra traz ela "eu vou acabar com a sua vida"; eu vou usar de toda a minha influência no Judiciário, que você sabe que eu tenho; eu tenho um tio juiz federal; eu trabalhei em várias varas, eu vendi semijoias a todas as secretárias e juizes do fórum e você ... vou acabar com a sua vida se você for embora daqui; eu disse, [REDACTED], eu vou assumir o convite da minha tia, eu vou para [REDACTED], assumi a secretaria de finanças, porque eu não quero mais você na minha vida; foi o momento que ela saiu; e foi embora espontaneamente, excelência: (...).

16

O réu, portanto, nega ter chutado, mordido ou praticado qualquer outro tipo de violência contra [REDACTED] além do que relatou em juízo.

Qual das duas versões, então, corresponde à verdade dos fatos, ou qual versão mais se aproximada da verdade dos fatos?

A resposta encontra-se dentro dos autos deste processo, precisamente no conjunto material de provas, em especial no Laudo de Exame de Corpo de Delito, que apontou lesão corporal leve e ausência de lesões internas, exame realizado quando Renata ainda estava na Unidade de Terapia Intensiva - UTI do hospital UDI, ou melhor, no dia dos fatos.

Analisando o laudo, **chega-se à conclusão que a vítima mentiu.** A vítima vem mentindo sobre os fatos desde a fase administrativa, Excelência. As lesões identificadas² no exame são, simplesmente, **incompatíveis com a descrição de chutes, socos, joelhadas, mordidas etc., matreiramente relatadas por [REDACTED]**

Outra mentira contada por [REDACTED] é que sua boca estava toda

² Escoriação com um e meio centímetros de extensão na região mentoniana, equimose com um centímetro de diâmetro na face anterior do punho direito, equimose com dois centímetros de extensão na mucosa do lábio inferior, escoriação com três milímetros de extensão na falange distal do 1º quirodáctilo esquerdo, duas escoriações com um e meio centímetros de extensão na região dorsal direita, edema com dois centímetros de diâmetro na região frontal, lado direito, escoriação com um centímetro de extensão na região ilíaca esquerda, equimose com um e meio centímetros de diâmetro no terço inferior da face anterior da coxa direita, equimose com dois centímetros de diâmetro no terço médio da face anterior da perna esquerda,